


مراقبت از دسترسی عروقی

کاتتر یکی از راههای دسترسی عروقی در بیماران همودیالیزی است. به زبان ساده یک لوله ی دو شاخه است که این لوله داخل یک رگ بزرگ به وسیله پزشک قرار داده می شود. این پرو سیجر با بی حسی موضعی انجام می شود و به وسیله بخیه زدن روی پوست ثابت میگردد. رگهای مورد استفاده جهت شالون در گردن و یا کشاله ران می باشد.



انواع کاتتر

کاتتر موقت: تا زمانیکه دسترسی دائم (مثل: فیستول، گرفت یا کاتتر دیالیز صفاقی) هنوز آماده نشده است و همچنین در انجام دیالیز اورژانسی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاتتر تا ۶ هفته قابل استفاده میباشد معمولاً طی ۳ الی ۴ هفته تعویض میشود و کاتتر رانی بعد از ۲ جلسه دیالیز تعویض می گردد.

کاتتر دائم: در برخی بیماران به علت عدم مناسب بودن عروق جهت تعبیه گرفت یا فیستول کاتتر دائم به نام **پرمیکت** گذاشته می شود. که طی ۱ الی ۲ سال کار می کند.

عوارض کاتتر

سوزن نخوردن با هر بار دیالیز از محاسن کاتتر می باشد. اما از مهمترین خطرات در کوتاه مدت ایجاد **لخته** و **عفونت** است. و جهت پیشگیری از لخته پرستار پایان دیالیز لاین ها را با محلول هپارین شستشو می دهد. و محل کاتتر به ویژه کاتتر دائم پانسمان استریل می کند.

مراقبت از کاتتر

در طول قطع و وصل دیالیز برای پیشگیری از انتقال عفونت حتماً از ماسک استفاده شود.

◀ سر پوش های کاتتر همیشه بسته باشد.

◀ هفته ای سه بار پانسمان ها در بخش دیالیز یا مرکز درمانی دیگر تعویض شود.

◀ مراقب تا شدگی یا خمیدگی لوله ها باشید و با آنها بازی نکنید. از ورود ضربه یا ایجاد کشش بر روی لوله ها خودداری کنید.

◀ با استفاده از ثابت کننده ها مانند سرچی فیکس از حرکت کاتتر در ناحیه گردن جلوگیری کنید.

◀ کلمپ ها فقط توسط پرستار باز و بسته شود.

◀ در صورت مراجعه به مراکز درمانی اجازه استفاده از کاتتر جهت **خونگیری** یا **دادن سرم** و **دارو** داده نشود.

◀ در صورت باز شدن بخیه یا جابجایی کاتتر دستکاری نشود و جلو و عقب کشیده نشود در این صورت به پزشک مراجعه شود.

◀ زمان استحمام کوتاه باشد و نواحی مختلف به ترتیب شستشو داده شود و حتی الامکان آب روی کاتتر سرازیر نشود.

◀ بلافاصله بعد از استحمام محل کاتتر خشک و پانسمان استریل گذاشته شود.

◀ اگر دیالیز طبق تشخیص پزشک قطع شد هفته ای ۲ الی ۳ بار به یکی از مراکز درمانی مراجعه کرده و کاتتر را هپارینه نمایید.

نکات قابل توجه

☞ محل ورود کاتتر را از نظر علائمی مانند **خونریزی**، **تورم** و **ترشح** کنترل کنید.

☞ در صورت **درد** در محل کاتتر و یا قفسه سینه به پزشک مراجعه کنید.

☞ در صورت **تب** و **لرز** و یا احساس ناخوشی به پزشک مراجعه کنید.